


**ЦИСТИНОЛ АКУТ**  
Таблетки, покрытые оболочкой



**Листок-вкладыш. Инструкция для пациента.**

*К N 4 от 30.04.15*

Внимательно прочитайте листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните листок-вкладыш, может быть, Вам понадобится прочитать его еще раз. Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта. Если сочтете необходимым, обратитесь к ним за советом.

**Основные физико-химические свойства**

Светло-зеленые, глянцевые таблетки овальной формы, покрытые оболочкой.

**Состав лекарственного средства**

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:

*активное вещество:* 238,7-297,5 мг сухого экстракта листьев толокнянки обыкновенной (3,5-5,5:1), что соответствует 70 мг производных гидрохинона, в пересчёте на арбутин безводный.

*Экстрагент:* этанол 60% (об/об).

*прочие ингредиенты (наполнители):* целлюлоза микрокристаллическая, длинноцепочные парциальные глицериды (Partialglycerida longicatenalia), гипромелоза, лактозы моногидрат, макрогол 6000, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, хинолиновый желтый Е 104, индигокармин Е 132, титана диоксид Е 171.

**МНН:** отсутствует

**Лекарственная форма**

Таблетки, покрытые оболочкой

**Фармакотерапевтическая группа**

Прочие средства, используемые для лечения урологических заболеваний.

Код АТС: G04BX

**Фармакологические свойства**

Биологически активные вещества экстракта листьев толокнянки обладают антибактериальным действием.

**Показания к применению**

В комплексной терапии воспалительных заболеваний нижних отделов мочевыводящих путей после консультации врача.

**Противопоказания**

- гиперчувствительность к листьям толокнянки или к любому другому компоненту лекарственного средства;
- беременность и лактация;
- дети до 12 лет;
- нарушения функции почек;
- заболевания почек.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Цистинол Акут таблетки, покрытые оболочкой, содержат препарат листьев толокнянки и поэтому не должны применяться вместе с препаратами, которые повышают кислотность мочи, поскольку возможно уменьшение антибактериального эффекта листьев толокнянки.

### **Меры предосторожности.**

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются расстройства мочеиспускания, боли спастического характера или появляется кровь в моче) необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы не следует принимать лекарственное средство Цистинол Акут.

Не применять более одной недели.

Не рекомендовано назначать пациентам с кислой реакцией мочи.

Применение лекарственного средства у мужчин возможно только после консультации врача и исключения серьезных заболеваний мочеполовой системы.

Детям в возрасте 12-18 лет прием лекарственного средства возможен только по назначению врача и под медицинским наблюдением.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказано для приема в период беременности и лактации.

### **Влияние на способность управлять автомобилем и работать с техникой**

Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

### **Способ применения и дозы**

Взрослые и подростки старше 12 лет принимают по 2 таблетки 3 раза в день. Таблетки необходимо запивать большим количеством жидкости, предпочтительно водой, после приема пищи.

Если врач не назначил иное, лекарственное средство, содержащее арбутин нельзя применять более 1 недели и не больше 5 раз в год.

Цистинол акут таблетки, покрытые оболочкой противопоказаны детям до 12 лет.

### **Передозировка**

При длительном применении возможно обострение воспалительного процесса в почках и мочевыводящих путях (дизурия, гематурия), нарушение функции печени. Прием высоких доз может привести к нарушению функции желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота), появлению шума в ушах, дыхательных расстройств, коллапса, делирия, судорог.

В случае появления симптомов передозировки необходимо немедленно прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу, который примет решение о необходимых мерах.

### **Побочные действия**

Оценка побочных эффектов по частоте их возникновения оценивается следующим образом:

- очень часто: ( $\geq 1/10$ )
- часто: ( $\geq 1/100$  до  $< 1/10$ )
- нечасто: ( $\geq 1/1000$  до  $< 1/100$ )
- редко: ( $\geq 1/10000$  до  $< 1/1000$ )
- очень редко: ( $< 1/10000$ )

АСОВ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

- неизвестно: (невозможно оценить по доступным данным).

Редко возможны нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, боли в эпигастрии).

Редко возможны аллергические реакции.

Возможно окрашивание мочи в темно-зеленый цвет.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Срок годности**

3 года.

Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке и на блистере после "использовать до".

Срок годности относится к последнему дню этого месяца.

**Хранение**

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

**Упаковка и содержимое**

По 15 таблеток в блистере из ПВХ/ПВДХ и фольги алюминиевой, по 2 блистера с листком-вкладышем помещают в картонную коробку;

или по 20 таблеток в блистере из ПВХ/ПВДХ и фольги алюминиевой, по 2, 3 или 5 блистеров с листком-вкладышем помещают в картонную коробку.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Шапер & Брюммер ГмбХ & Ко. КГ

Банхофштрассе, 35

38259 Зальцгиттер, Германия/

Schaper & Brummer GmbH & Co. KG

Bahnhofstrasse, 35

38259 Salzgitter, Germany