

28.04.2017  
[Signature]

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
от 06.06.2017 № 633

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению**  
**лекарственного средства**  
**(информация для специалистов)**

**ДЕНТОКИНД**

**Основные физико-химические свойства**

Белая или почти белая плоскоцилиндрическая таблетки с фаской.

**Состав лекарственного средства**

В 1 таблетке (100 мг) содержатся:

*активные вещества:* Belladonna (Белладонна) D6 15 мг, Chamomilla (Ромашка аптечная) D6 15 мг, Ferrum phosphoricum (Фосфат железа) D6 15 мг, Hepar sulfuris (Гепар сульфур) D12 15 мг, Pulsatilla (Пульсатилла) D6 15 мг;

*вспомогательные вещества:* микрокристаллическая целлюлоза, лактозы моногидрат, тальк, магния стеарат.

**Лекарственная форма**

Таблетки.

**Международное непатентованное название**

Отсутствует.

**Фармакотерапевтическая группа**

Гомеопатическое лекарственное средство.

Код АТС: V03AX. Прочие лекарственные средства.

**Фармакологические свойства**

Гомеопатическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

**Область применения**

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется при болезненных явлениях при прорезывании зубов у детей.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте применения.

В случае выраженных симптомов необходимо назначение соответствующей клинически обоснованной терапии.

**Способ применения и дозировка**

Дети от 1 года до 6 лет:

При выраженных симптомах: по 2 таблетки через каждый час, но не более 6 раз в сутки. При уменьшении выраженности симптомов следует уменьшить частоту приема: по 2 таблетки 3 раза в сутки, далее уменьшить частоту приема.

Дети от 4 месяцев до 1 года:

Перед применением у детей до 1 года необходима консультация врача.

При выраженных симптомах: по 1 таблетке через каждый час, но не более 6 раз в сутки. При уменьшении выраженности симптомов следует уменьшить частоту приема: по 1 таблетке 3 раза в сутки, далее уменьшить частоту приема.

Дети в возрасте до 4 месяцев: применение у детей в возрасте до 4 месяцев не рекомендуется.

Перед применением таблетки растворять в небольшом количестве кипяченой воды комнатной температуры (около 10 мл), принимать за полчаса до или через полчаса после еды.

Продолжительность применения лекарственного средства определяется врачом.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

#### **Побочные действия**

Возможно развитие аллергических реакций.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение данного лекарственного средства и обратиться к врачу.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

#### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к какому-либо из активных или вспомогательных веществ.

#### **Передозировка**

О случаях передозировки до настоящего времени не сообщалось.

#### **Меры предосторожности**

Гомеопатическое лекарственное средство. Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

Дентокинд таблетки содержат моногидрат лактозы. В связи с содержанием лактозы лекарственное средство не следует принимать пациентам с врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае продолжительного приема гомеопатического средства необходимо наблюдение врача, специализирующегося на гомеопатическом методе лечения, поскольку возможно возникновение нежелательных симптомов.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

#### *Применение у детей*

Перед применением у детей до 1 года необходима консультация врача.

Применение у детей в возрасте до 4 месяцев не рекомендуется.

#### *Беременность и кормление грудью.*

Дентокинд таблетки не предназначены для применения взрослыми.

Данные о влиянии на фертильность отсутствуют.

*Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами.*

Дентокинд таблетки не оказывают или оказывают незначительное влияние на способность вождения автомобиля и работу с механизмами.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не наблюдались. Применение данного гомеопатического средства не исключает применения других лекарственных средств.

**Условия хранения и срок годности**

Хранение данного лекарственного средства не требует особых условий. Срок годности данного гомеопатического средства составляет 5 лет при должном хранении в закрытой упаковке.

**Категория отпуска**

Отпускается без рецепта.

**Форма выпуска и упаковка**

Стеклянные флаконы по 150 таблеток, упакованные в картонные коробки.

**Фирма-производитель, адрес**



Дойче Хомеопати-Унион  
ДХУ-Аршнайmittel GmbH & Co. KG  
Германия, 76227 Карлсруэ,  
Оттоштрассе 24  
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG  
Germany, Karlsruhe 76227  
Ottostrasse 24  
tel. +49 (721) 40 93 236

**Представитель в Республике Беларусь**

Представительство "Alpen Pharma AG" в Республике Беларусь  
220053 г. Минск, ул. Пархоменко 3, офис 1Б  
тел/факс (+375 17) 3350642.