

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
лекарственного средства
(информация для специалистов)

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от 26.05.2011 № 591

ДОРМИКИНД
таблетки

Основные физико-химические свойства

Белая или почти белая таблетка плоскоцилиндрической формы с фаской.

Состав лекарственного средства

В 1 таблетке (100 мг) содержится:

активные вещества: Cypripedium pubescens (Башмачок пушистый) D4 15 мг, Magnesium carbonicum (Магния карбонат) D10 20 мг, Zincum valerianicum (Цинкум Валерианик) D12 15 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, тальк, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Международное непатентованное название

Отсутствует.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

Код ATC: V03AX. Прочие лекарственные средства.

Фармакологические свойства

Гомеопатическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется при беспокойстве и нарушениях сна у детей.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте применения.

В случае выраженных симптомов необходимо назначение соответствующей клинически обоснованной терапии.

Способ применения и дозировка

Дети от 3 месяцев до 6 лет: по 1 таблетке до 4 раз в день. При уменьшении выраженности симптомов следует уменьшить частоту приема.

Перед применением у детей до 1 года необходима консультация врача.

Дети в возрасте до 3 месяцев: применение у детей в возрасте до 3 месяцев не рекомендуется.

Перед применением таблетки растворять в небольшом количестве кипяченой воды комнатной температуры (около 10 мл), принимать за полчаса до или через полчаса после еды.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Продолжительность применения лекарственного средства определяется врачом.
Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Побочные действия

Возможно развитие аллергических реакций.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение данного лекарственного средства и обратиться к врачу.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Гиперчувствительность к какому-либо из активных или вспомогательных веществ.

Передозировка

О случаях передозировки до настоящего времени не сообщалось.

Меры предосторожности

Гомеопатическое лекарственное средство. Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

Дормикинд таблетки содержат моногидрат лактозы. В связи с содержанием лактозы лекарственное средство не следует принимать пациентам с врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или мальабсорбией глюкозы-галактозы.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае продолжительного приема гомеопатического средства необходимо наблюдение врача, специализирующегося на гомеопатическом методе лечения, поскольку возможно возникновение нежелательных симптомов.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Применение у детей

Перед применением у детей до 1 года необходима консультация врача.

Применение у детей в возрасте до 3 месяцев не рекомендуется.

Беременность и кормление грудью.

Дормикинд таблетки не предназначены для применения взрослыми.

Данные о влиянии на fertильность отсутствуют.

Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

При случайном приеме взрослым рекомендовано соблюдать осторожность при вождении автомобиля и работе с механизмами.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не наблюдались. Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Условия хранения и срок годности

Хранение данного лекарственного средства не требует особых условий. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности данного гомеопатического средства составляет 5 лет при должном хранении в закрытой упаковке.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Форма выпуска и упаковка

Стеклянные флаконы по 150 таблеток, упакованные в картонные коробки.

Фирма-производитель, адрес



Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homoeopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
Germany, Karlsruhe 76227
Ottostrasse 24
tel. +49 (721) 40 93 236

Представитель в Республике Беларусь

Представительство "Alpen Pharma AG" в Республике Беларусь
220053 г. Минск, ул. Пархоменко 3, офис 1Б
тел/факс (+375 17) 3350642.