

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
лекарственного средства
(информация для специалистов)



ДИСМЕНОРМ

Основные физико-химические свойства

Белые или почти белые плоские таблетки с фаской, допускается незначительная крапчатость.

Состав

1 таблетка (250 мг) содержит:

активные вещества: Vitex Agnus castus (витекс священный) Ø 125 мг (сухой остаток 1,0 мг), Apis mellifica (пчела медоносная) трит. D3 25 мг, Pulsatilla pratensis (прострел луговой) трит. D3 25 мг, Rosmarinus officinalis (розмарин лекарственный) трит. D2 25 мг.

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал пшеничный, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

Код АТХ: G02CX – Прочие лекарственные средства, применяемые в гинекологии.

Фармакологические свойства

Дисменорм является комбинированным средством, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав. Он применяется в комплексном лечении нарушений менструального цикла и проявлений предменструального синдрома.

Фармакокинетика

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Показания к применению

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Традиционно применяется в комплексном лечении нарушений менструального цикла и проявлений предменструального синдрома.

Способ применения и дозы

Если не назначено иначе, Дисменорм следует принимать следующим образом: при выраженных симптомах следует принимать по 1 таблетке каждые полчаса-час (до 6 раз в сутки). Увеличение суточной дозы и увеличение длительности приема более одной недели может осуществляться только после консультации с врачом.

При хронических состояниях следует принимать по 1 таблетке 1-3 раза в день.

По мере улучшения состояния частота приема должна быть уменьшена.

Продолжительность приема лекарственного средства определяет врач.

Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться в полости рта.

Побочные действия

Очень редкие (<1/10 000) или частота развития побочных эффектов не может быть определена по имеющимся данным. Лекарственные средства, содержащие Vitex Agnus castus

(витекс священный), могут вызывать головную боль, головокружения, желудочно-кишечные расстройства, такие, как тошнота и абдоминальная боль, акне и нарушения менструального цикла. Кроме того имеются сообщения об отдельных случаях реакции гиперчувствительности, таких как кожные высыпания, крапивница (зудящие пузыри), а также серьезных аллергических реакций, симптомами которых являются отек лица, одышка (диспноэ) и затрудненность глотания. В подобных случаях дальнейший прием препарата Дисменорм следует отменить и назначить соответствующее лечение.

Примечание: При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение имеющихся симптомов заболевания (первоначальное ухудшение). В подобных случаях дальнейший прием лекарственного средства следует отменить.

Противопоказания

Эстроген-зависимые опухоли и опухоли гипофиза. Индивидуальная непереносимость (повышенная чувствительность) на пчелиный яд, пшеничный крахмал или любой из компонентов лекарственного средства.

Детский возраст до 18 лет.

Период лактации.

Лекарственное средство не предназначено для применения в период беременности.

Передозировка

Неблагоприятные явления в случаях передозировки препарата Дисменорм на настоящий момент не известны.

Меры предосторожности

Пациентам, страдающим редкими наследственными заболеваниями непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или нарушениями всасывания глюкозы-галактозы, принимать препарат не следует.

Пшеничный крахмал может содержать глютен, но лишь в следовых количествах, поэтому препарат считается безопасным для пациентов, страдающих глютенчувствительной целиакией.

Показаниями к применению не предусмотрено применение препарата в период беременности.

С учетом действующего вещества препарата Vitex Agnus castus (витекс священный) Дисменорм не следует принимать в период лактации.

Лекарственное средство содержит пшеничный крахмал, поэтому пациентам с повышенной чувствительностью или непереносимостью глютена не следует его применять.

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача для уточнения диагноза и исключения эстрогенчувствительных опухолей и опухолей гипофиза.

Гомеопатические лекарственные средства не должны применяться в течение длительного времени без консультации врача.

Влияние на способность вождения автотранспорта и работы со специальным оборудованием

Препарат Дисменорм не оказывает воздействия на способность управления автотранспортом или работу с другими механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Вследствие возможной допаминергической и эстрогенной активности действующего вещества Vitex Agnus castus (витекс священный), вероятно взаимодействие лекарственного средства с препаратами агонистами и антагонистами допаминовых рецепторов, препаратами эстрогенов и антиэстрогенов.



При приеме в настоящее время, или приеме ранее каких бы то ни было лекарственных препаратов, пациентам рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения и срок годности

Хранить в оригинальной упаковке при температуре 15–25 °С в недоступном для детей месте.
Срок годности составляет **5 лет**.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Форма выпуска и упаковка

Таблетки.

По 80 таблеток во флаконе из коричневого стекла с пластмассовой навинчивающейся крышкой. По 1 флакону пакуют в коробку вместе с листком-вкладышем.

Производитель

Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Germany, Karlsruhe 76227
Ottostrasse 24
tel. +49 (721) 40 93 236

