

27.04.2017г
[Signature]

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от 26.05.2014 № 541

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства
(информация для специалистов)

ЭНТЕРОКИНД

Основные физико-химические свойства

Прозрачный, бесцветный, вязкий раствор.

Состав

В 20 мл раствора содержится:

активные вещества: Chamomilla (Ромашка аптечная) D6 2,36 г, Cina (Цина) D6 2,36 г, Colocynthis (Колоцинт обыкновенный) D6 2,36 г, Lac defloratum (Лак дефлоратум) D6 2,36 г, Magnesium chloratum (Магния хлорид) D6 2,36 г;

вспомогательные вещества: ксилит, глицерин 85%, вода очищенная.

Лекарственное средство содержит 3,1 % (об./об.) этанола, то есть 2,8 мг на разовую дозу (3 капли).

Лекарственная форма

Капли для внутреннего применения.

Международное непатентованное название

Отсутствует.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

Код АТС: V03AX. Прочие лекарственные средства.

Фармакологические свойства

Гомеопатическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется при функциональных расстройствах кишечника и метеоризме.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте применения.

Способ применения и дозировка

Дети до 6 лет:

При острых симптомах по 3 капли через каждый час не более 6 раз в день; после ослабления симптоматики - 3 капли 3 раза в день.

Капли предпочтительно принимать за полчаса до или через полчаса после еды. При необходимости капли можно смешивать с небольшим количеством воды.

Продолжительность лечения 3-6 дней.

Продолжительность применения лекарственного средства определяется врачом.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Побочные действия

Возможно развитие аллергических реакций.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение данного лекарственного средства и обратиться к врачу.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить применение данного лекарственного средства и проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Гиперчувствительность к какому-либо из активных или вспомогательных веществ.

Передозировка

О случаях передозировки до настоящего времени не сообщалось.

Меры предосторожности

Гомеопатическое лекарственное средство. Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае продолжительного приема гомеопатического средства необходимо наблюдение врача, специализирующегося на гомеопатическом методе лечения, поскольку возможно возникновение нежелательных симптомов.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Лекарственное средство содержит небольшое количество этанола - 2,8 мг на разовую дозу (3 капли).

Беременность и кормление грудью.

ЭНТЕРОКИНД не предназначен для применения взрослыми.

Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Лекарственное средство предназначено для детей.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия и сроки хранения

Хранение этого лекарственного средства не требует особых условий. Хранить в недоступном для детей месте. Срок хранения данного гомеопатического препарата составляет 5 лет, при условии хранения в оригинальной упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Упаковка и ее содержимое

Капли для внутреннего применения, по 20 мл раствора во флаконах, упакованных в картонную коробку вместе с инструкцией для медицинского применения препарата.

Фирма-производитель, адрес



Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
Germany, Karlsruhe 76227
Ottostrasse 24
tel. +49 (721) 40 93 236

Представитель в Республике Беларусь

Представительство "Alpen Pharma AG" в Республике Беларусь
220053 г. Минск, ул. Пархоменко 3, офис 1Б
тел/факс (+375 17) 3350642.