



ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
лекарственного средства
(информация для специалистов)

ИММУНОКИНД

Основные физико-химические свойства

Белая или почти белая плоскоцилиндрическая таблетка с фаской.

Состав лекарственного средства

В 1 таблетке (100 мг) содержатся:

активные вещества: Calcium carbonicum Hahnemannii (Кальций карбоникум Ганеманна) D6 20 мг, Calcium fluoratum (Кальция фторид) D6 20 мг, Calcium phosphoricum (Кальция фосфат) D6 20 мг, Sulfur iodatum (Серы йодид) D12 20 мг (активные вещества содержат лактозу);
вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, тальк, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Международное непатентованное название

Отсутствует.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

Код АТС: V03AX. Прочие лекарственные средства.

Фармакологические свойства

Гомеопатическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется для поддержки иммунной системы у детей грудного и младшего возраста.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте применения.

В случае выраженных симптомов необходимо назначение соответствующей клинически обоснованной терапии.

Способ применения и дозировка

Дети от 3 месяцев до 6 лет: по 1 таблетке до 3 раз в сутки.

Перед применением у детей до 1 года необходима консультация врача.

Дети в возрасте до 3 месяцев: применение у детей в возрасте до 3 месяцев не рекомендуется.

Перед применением таблетки растворять в небольшом количестве кипяченой воды комнатной температуры (около 10 мл), принимать за полчаса до или через полчаса после еды.

Продолжительность применения лекарственного средства определяется врачом.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Побочные действия

Возможно развитие аллергических реакций.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение данного лекарственного средства и обратиться к врачу.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Гиперчувствительность к какому-либо из активных или вспомогательных веществ.

Передозировка

О случаях передозировки до настоящего времени не сообщалось.

Меры предосторожности

Гомеопатическое лекарственное средство. Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

Пациентам с заболеваниями щитовидной железы перед применением необходима консультация лечащего врача.

Иммунокинд таблетки содержат лактозу. В связи с содержанием лактозы лекарственное средство не следует принимать пациентам с врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае продолжительного приема гомеопатического средства необходимо наблюдение врача, специализирующегося на гомеопатическом методе лечения, поскольку возможно возникновение нежелательных симптомов.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Применение у детей

Перед применением у детей до 1 года необходима консультация врача.

Применение у детей в возрасте до 3 месяцев не рекомендуется.

Беременность и кормление грудью.

Иммунокинд таблетки не предназначены для применения взрослыми.

Данные о влиянии на фертильность отсутствуют.

Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Иммунокинд таблетки не оказывают или оказывают незначительное влияние на способность вождения автомобиля и работу с механизмами.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не наблюдались.

Применение данного гомеопатического средства не исключает применения других лекарственных средств.

Условия хранения и срок годности

Хранение данного лекарственного средства не требует особых условий. Срок годности данного гомеопатического средства составляет 5 лет при должном хранении в закрытой упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Форма выпуска и упаковка

Стеклянные флаконы по 150 таблеток, упакованные в картонные коробки.

Фирма-производитель, адрес



Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
Germany, Karlsruhe 76227
Ottostrasse 24
tel. +49 (721) 40 93 236

Представитель в Республике Беларусь

Представительство "Alpen Pharma AG" в Республике Беларусь
220053 г. Минск, ул. Пархоменко 3, офис 1Б
тел/факс (+375 17) 3350642.