

**ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
лекарственного средства
(информация для специалистов)**



ИНФЛЮЦИД

Основные физико-химические свойства

Прозрачный раствор светло-желтого цвета, возможен зеленоватый оттенок.

Состав:

В 10 г раствора содержится:

Действующие вещества: Aconitum (аконит аптечный) D3 1 г, Gelsemium (гельземий венчнозеленый) D3 1 г, Ipecacuanha (ипекакуана) D3 1 г, Phosphorus (фосфор) D5 1 г, Bryonia (переступень двудомный) D2 1 г, Eupatorium perfoliatum (посконник пронзеннолистный) D1 1 г.
вспомогательные вещества: этиловый спирт 96%, вода очищенная.

Лекарственная форма

Капли для приема внутрь

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство

АТХ код: R05X. Прочие средства, применяемые при простудных заболеваниях.

Фармакологические свойства

Инфлюцид представляет собой гомеопатическое комбинированное лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав. Инфлюцид применяется в комплексном лечении гриппа и острых респираторных заболеваний, в т.ч. сопровождающихся повышением температуры.

Фармакокинетика

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Показания к применению

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Традиционно применяется в комплексном лечении гриппа и острых респираторных заболеваний.

Способ применения и дозы

Если не назначено иначе, Инфлюцид следует принимать следующим образом:

при острых симптомах заболевания: взрослым и детям старше 12 лет следует принимать каждые полчаса-час по 5 капель лекарственного средства (до 6 раз в сутки).

Увеличение суточной дозы и увеличение длительности приема более одной недели может осуществляться только после консультации с врачом. При уменьшении выраженности симптомов частота приема снижается – взрослым и детям старше 12 лет следует принимать по 5 капель лекарственного средства 1-3 раза в сутки. В дальнейшем по мере улучшения состояния частота приема снижается дополнительно.

Для обеспечения правильного дозирования лекарственного средства следует удерживать бутылку вертикально.

Следует принимать лекарственное средство за полчаса до или через полчаса после еды, перед проглатыванием рекомендовано немного подержать капли во рту. В случае необходимости капли могут быть разбавлены перед приемом в небольшом количестве воды.

Побочные действия

В редких случаях возможны реакции гиперчувствительности, такие, как аллергические реакции или желудочно-кишечные нарушения. В подобных случаях дальнейший прием препарата следует отменить и назначить соответствующее лечение.

Общее примечание: При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение имеющихся симптомов заболевания (первоначальное ухудшение). В подобных случаях дальнейший прием лекарственного средства следует отменить.

Противопоказания

Препарат противопоказан пациентам с реакцией гиперчувствительности к любому компоненту в составе препарата. Вследствие содержания спирта Инфлюцид не следует применять в терапии пациентов, страдающих алкогольной зависимостью.

Передозировка

Неблагоприятные явления в случаях передозировки препаратом Инфлюцид до настоящего времени не известны.

Меры предосторожности

Переоценка целесообразности терапии необходима в следующих случаях

- при отсутствии улучшения состояния или его ухудшения,
- при появлении дополнительных неблагоприятных явлений,
- при стойком сохранении повышенной температуры тела или повышении температуры тела до 39°C.

Инфлюцид содержит 46% (объемное соотношение) спирта. Возможны особые риски для пациентов, страдающих заболеваниями печени или эпилепсией, а также в период беременности и лактации. По той же причине Инфлюцид, капли для приема внутрь, не назначают детям возрастом до 12 лет.

Гомеопатические лекарственные средства не должны использоваться в течение длительного времени без консультации врача.

Применение в период беременности и лактации

В связи с отсутствием достаточных клинических данных и содержанием этилового спирта применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны. Вследствие содержания спирта возможно влияние на действие других лекарственных средств.

Влияние на способность вождения автотранспорта и работы со специальным оборудованием

В связи с содержанием этилового спирта прием лекарственного средства может оказать отрицательное влияние на способность управления транспортными средствами и работу с другими механизмами.

Условия хранения и срок годности

Хранить при температуре от 15 °C до 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте!

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Срок годности составляет 5 лет.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Форма выпуска и упаковка

Капли для приема внутрь.

По 30 мл раствора во флаконе из коричневого стекла, с капельницей и с пластмассовой навинчивающейся крышкой. По 1 флакону пакуют в коробку вместе с листком-вкладышем.

Производитель

Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homoeopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Germany, Karlsruhe 76227
Ottostrasse 24
tel. +49 (721) 40 93 236

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь