

18.10.2013г.
ПМ

Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства для
специалистов

ИНФЛЮЦИД

Общие физико-химические свойства

Таблетки белого или почти белого цвета, плоские, со скошенной кромкой, возможны незначительные вкрапления.

Состав лекарственного средства

1 таблетка (250 мг) содержит:

Активные вещества: Aconitum (аконит аптечный) D3 25 мг, Gelsemium (гельземий вечнозелёный) D3 25 мг, Ipecacuanha (ипекакуана) D3 25 мг, Phosphorus (фосфор) трит. D5 25 мг, Bryonia (переступень двудомный) D2 25 мг, Eupatorium perfoliatum (посконник пронзённостистный) D1 25 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, пшеничный крахмал, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство

Код АТС: R05X – другие комбинированные препараты, применяемые при простудных заболеваниях.



Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Инфлюцид представляет собой гомеопатическое комбинированное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав. Традиционно применяется в комплексном лечении гриппа и острых респираторных заболеваний.

Фармакокинетика.

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Показания к применению

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний. Традиционно применяется в комплексном лечении гриппа и острых респираторных заболеваний.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата; непереносимость крахмала; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Детям до 1 года (в связи с отсутствием достаточного опыта применения)

Способ применения и дозы

При отсутствии иных указаний Инфлюцид применяют следующим образом:

При острых состояниях: следует принимать по 1 таблетке каждые полчаса – 1 час (до 6 раз в сутки). Увеличение суточной дозы и длительности приёма более недели может осуществляться только после консультации с врачом. При уменьшении выраженности симптомов частота приёма снижается – по 1 таблетке 3 раза в сутки. В дальнейшем по мере улучшения состояния частота приёма снижается дополнительно.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет принимают не более 4 таблеток в сутки (не более двух третей от суточной дозы у взрослых).

Дети в возрасте до 6 лет получают не более 3 таблеток в сутки (не более половины суточной дозы взрослых).

Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно растворяться во рту. При лечении детей до 6 лет таблетки рекомендуется растворять в небольшом количестве воды.

Гомеопатические лекарственные средства не должны использоваться в течение длительного времени без консультации врача.

Побочные действия

В редких случаях возможны такие реакции гиперчувствительности, как высыпания на коже или желудочные расстройства.

Передозировка

Вредные эффекты передозировки препарата Инфлюцид до настоящего времени не известны.



Особые меры предосторожности

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение. При сохранении высокой температуры тела или при её повышении более 39°C, при сохранении симптомов или появлении новых симптомов может потребоваться назначение дополнительных обследований и другого лечения.

Предостережение для пациентов с целиакией. Инфлюцид содержит пшеничный крахмал. Пациентам с аллергией на пшеницу применять лекарственное средство не рекомендуется. Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует принимать данное лекарственное средство.

В связи с отсутствием достаточного опыта применения, Инфлюцид не следует применять у детей до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Клинических данных о применении лекарственного средства во время беременности и лактации недостаточно. Во время беременности и лактации препарат следует применять, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребёнка).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами

Не влияет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

До настоящего времени не известны.

Лечение гомеопатическими препаратами не исключает применения других лекарственных средств.

Условия хранения и срок годности

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 15 до 25°C в местах, недоступных для детей.

Срок годности данного гомеопатического лекарственного средства при условии его должного хранения в закрытой упаковке составляет **5 лет**.

Правила отпуска

Отпускается без рецепта.

Форма выпуска и размер упаковки

По 20 таблеток в блистер из плёнки ПВХ и фольги алюминиевой. 3 блистера пакуют в картонную коробку с листком-вкладышем для пациентов.

Предприятие-производитель

Дойче Хомеопати Унион ДХУ-Арнаймиттель ГмбХ & Ко КГ Германия, 76227 Карлсруэ, Оттоштрассе 24 Тел.: + 49 (721) 40 93 236	Deutsche Homopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG Germany, Karlsruhe 76227 Ottostrasse 24 tel. + 49 (721) 40 93 236
---	--

Произведено:

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко КГ,
Германия



Представитель в республике Беларусь
Representative office of "Alpen Pharma AG"
220053 Minsk, Parhomenko street 3, office 1B
Tel./Fax (+375 17) 3350642.

Представительство компании "Alpen Pharma AG" в Республике Беларусь
22053 г, Минск, ул. Пархоменко 3, офис 1Б
Тел./факс (+375 17) 3350642.