

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь № 984

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
лекарственного средства
(информация для специалистов)

28.09.15 № 984
ЛС № 18-01.09.15

ИСЛА-МООС

Основные физико-химические свойства

Плоские, неравномерно округлые, линзоподобные, коричневатые пастилки. Пастилки могут содержать пузырьки воздуха.

Состав лекарственного средства

1 пастилка содержит:

активные вещества: густой водный экстракт исландского мха (0,4-0,8:1) - 80 мг;
прочие ингредиенты (наполнители): акация (гуммиарабик) (E414), вода очищенная, сахароза (из экстракта), карамель (E150c), сахароза, парафин жидкий.

Лекарственная форма

Пастилки.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие антисептические средства, применяемые для лечения заболеваний горла.

Код ATC R02A A20.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Действующим веществом лекарственного средства Исла-Моос является экстракт исландского мха. Полисахариды, входящие в состав исландского мха, оказывают обволакивающее действие на слизистую оболочку верхних дыхательных путей и способствуют уменьшению кашлевого рефлекса и связанного с ним сухого кашля.

Фармакокинетика. Фармакокинетика не изучена, так как лекарственное средство содержит различные биологически активные вещества.

Показания к применению

Местное лечение в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта и глотки, сопровождающихся сухим кашлем.

Режим дозирования и способ употребления

Применение у детей

Лекарственное средство предназначено для детей старше 6 лет, поскольку пастилки необходимо держать во рту, давая им медленно раствориться.

Взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1-2 пастилки 3-4 раза в день, детям с 6 до 12 лет – по 1 пастилке 3-4 раза в день. Пастилки следует медленно рассасывать во рту до полного растворения.

Длительность лечения определяется врачом с учётом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Если в течение 4-5 дней стойкие симптомы заболевания не уменьшаются или, наоборот, ухудшаются, при возникновении одышки, лихорадки, а также гнойной и кровавой мокроты необходимо немедленно проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны следующие побочные реакции: боль в животе, тошнота, аллергические реакции

Противопоказания

Повышенная чувствительность к веществам, содержащимся в лекарственном средстве. Беременность, период кормления грудью, детский возраст до 6 лет.

Передозировка

Сообщений о случаях передозировки не поступало.

Особые меры предосторожности

Препарат Исла-Моос необходимо принимать с осторожностью пациентам, страдающим сахарным диабетом. В одной пастилке содержится 424 мг сахараозы, что соответствует 0,035 хлебных единиц. В связи с содержанием сахараозы пастилки не следует принимать пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или сахаразной-изомальтазной недостаточностью.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Беременность и кормление грудью

Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

Применение у детей

Лекарственное средство Исла-Моос не рекомендовано для детей до 6 лет.

Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении возможно нарушение всасывания других лекарственных средств. В качестве меры предосторожности Исла-Моос не следует принимать за 1 час до или после приема других лекарственных средств.

Условия хранения и срок годности

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от влаги и недоступном для детей месте.

4 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Форма выпуска и упаковка

Пастилки; По 10 пастилок помещают в блистеры из алюминиевой фольги и ПВХ-пленки. 3 блистера (30 пастилок) вместе с инструкцией по применению помещают в картонную коробку.

Производитель

Производитель, осуществляющий производство готовой лекарственной формы:

Болдер Арнаймиттель ГмбХ и Ко. КГ

Рейнише Аллее11, 50858 Кельн, северная Рейн-Вестфалия, Германия

Производитель, осуществляющий фасовку и/или упаковку, контроль качества:

Энгельгард Арцнаймиттель ГмбХ и Ко. КГ

Херцбергштрассе, 3, Д-61138 Нидердорфельден, Германия