


28.04.2017
Р

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
лекарственного средства
(информация для специалистов)

КИНДИНОРМ
гранулы



Основные физико-химические свойства

Белые или почти белые сферические гранулы.

Состав лекарственного средства

В 10 г гранул (размер 5) содержатся:

активные вещества: Chamomilla (Ромашка аптечная) D12 25 мг, Kalium phosphoricum (Калия фосфат) D6 25 мг, Staphisagria (Стафизагрия) D12 25 мг; Valeriana (Валериана лекарственная) D6 25 мг;
вспомогательные вещества: сахароза.

Лекарственная форма

Гранулы.

Международное непатентованное название

Отсутствует.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

Код АТС: V03AX. Прочие лекарственные средства.

Фармакологические свойства

Гомеопатическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется при функциональных расстройствах нервной системы, сопровождающихся повышенной возбудимостью (неврастения).

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте применения.

В случае выраженных симптомов необходимо назначение соответствующей клинически обоснованной терапии.

Способ применения и дозировка

Дети от 1 года до 5 лет: по 2 гранулы от 1 до 3 раз в день.

Дети от 6 до 11 лет: по 3 гранулы от 1 до 3 раз в день.

Взрослые и дети 12 лет и старше: по 5 гранул от 1 до 3 раз в день.

При уменьшении выраженности симптомов следует уменьшить частоту приема.

Гранулы рекомендуется принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту. При необходимости гранулы можно растворять в небольшом количестве кипяченой воды комнатной температуры.

Детям в возрасте 1-6 лет перед применением гранулы следует растворять в небольшом количестве кипяченой воды комнатной температуры.

Продолжительность применения лекарственного средства определяется врачом.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Побочные действия

Возможно развитие аллергических реакций.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение данного лекарственного средства и обратиться к врачу.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Гиперчувствительность к какому-либо из активных или вспомогательных веществ.

Противопоказано детям младше 1 года.

Передозировка

О случаях передозировки до настоящего времени не сообщалось.

Меры предосторожности

Гомеопатическое лекарственное средство. Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

Киндинорм гранулы содержат сахарозу. В связи с содержанием сахарозы лекарственное средство не следует принимать пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы. В связи с содержанием сахарозы при приеме более 2 недель лекарственное средство может повредить зубы.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае продолжительного приема гомеопатического средства необходимо наблюдение врача, специализирующегося на гомеопатическом методе лечения, поскольку возможно возникновение нежелательных симптомов.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Применение у детей

Применение у детей до 1 года противопоказано.

Беременность и кормление грудью.

Лекарственное средство противопоказано для приема беременным и кормящим женщинам в связи с отсутствием данных.

Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Рекомендовано соблюдать осторожность при вождении автомобиля и работе с механизмами.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не наблюдались.

Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.

Условия хранения и срок годности

Хранение данного лекарственного средства не требует особых условий. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности данного гомеопатического средства составляет 5 лет при должном хранении в закрытой упаковке.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Форма выпуска и упаковка

Гранулы, по 10 г гранул в стеклянных флаконах с клеящейся этикеткой в складной картонной коробке.

Фирма-производитель, адрес



Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
Germany, Karlsruhe 76227
Ottostrasse 24
tel. +49 (721) 40 93 236

Представитель в Республике Беларусь

Представительство "Alpen Pharma AG" в Республике Беларусь
220053 г. Минск, ул. Пархоменко 3, офис 1Б
тел/факс (+375 17) 3350642.