

**ИНСТРУКЦИЯ  
по применению  
лекарственного средства  
(информация для специалистов)**

**ПРОСПАН® Сироп**

Торговое название: Проспан®.

Лекарственная форма: сироп.

**Состав.**

1 мл сиропа содержит:

*действующее вещество:* сухой экстракт листьев плюща (5-7,5:1) 7мг, экстрагент-30 % этиanol.

*вспомогательные вещества:* калия сорбат, лимонная кислота безводная, ксантановая камедь, ароматизатор вишневый (натуральный ароматизатор): бензальдегид, дистиллят лимонной корки, малиновый дистиллят, дистиллят какао, вишневая вода; сorbitола раствор 70% (кристаллизованный), вода очищенная.

**Описание.**

Светло-коричневый слегка мутный сироп со сладким, фруктовым вкусом и вишневым запахом.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Код ATC: R05CA12. Отхаркивающие средства.

**Фармакологические свойства.**

*Фармакодинамика.*

Действующим веществом лекарственного средства является сухой экстракт листьев плюща.

Отхаркивающее действие предположительно связано с раздражением слизистой оболочки желудка, при котором рефлекторно стимулируются секреторные бронхиальные железы слизистой оболочки бронхов.

*Фармакокинетика.*

Данные отсутствуют, лекарственное средство содержит различные биологически активные вещества.

**Показания к применению.**

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся кашлем.


**Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, а также растениям семейства аралиевых (Araliaceae).

Детский возраст до 2 лет.

**Применение во время беременности и кормления грудью.**

Безопасность применения в период беременности и кормления грудью не установлена. В связи с отсутствием данных прием лекарственного средства во время беременности и лактации не рекомендован.



### **Применение у детей.**

Лекарственное средство противопоказано детям до 2 лет из-за рисков утяжеления симптомов респираторного заболевания.

Применение лекарственного средства у детей в возрасте 2-4 лет возможно только после консультации врача.

### **Влияние на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами.**

Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

### **Способ применения и дозы.**

Внутрь.

Возраст	Разовая доза	Суточная доза препарата
<b>Взрослым и детям старше 12 лет</b>	5 мл сиропа (соответствуют 35 мг сухого экстракта листьев плюща)	15 мл сиропа (по 5 мл сиропа 3 раза в сутки), соответствуют 105 мг сухого экстракта листьев плюща
<b>Детям от 6 до 12 лет</b>	5 мл сиропа (соответствуют 35 мг сухого экстракта листьев плюща)	10 мл сиропа (по 5 мл сиропа 2 раза в сутки), соответствуют 70 мг сухого экстракта листьев плюща
<b>Детям от 2 до 6 лет</b>	2,5 мл сиропа (соответствуют 17,5 мг сухого экстракта листьев плюща)	5 мл сиропа (по 2,5 мл сиропа 2 раза в сутки), соответствуют 35 мг сухого экстракта листьев плюща

Как дозатор использовать входящий в комплект мерный колпачок.

### **Перед каждым употреблением необходимо хорошо взбалтывать флакон!**

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства, курс лечения обычно составляет 1 неделю. При отсутствии улучшения состояния во время приема лекарственного средства необходимо обратиться к врачу.

### **Побочное действие.**

Частота побочных реакций определяется с помощью следующей шкалы: очень часто ( $\geq 1/10$ ), часто ( $\geq 1/100$  до  $< 1/10$ ), нечасто ( $\geq 1/1000$  до  $< 1/100$ ), редко ( $\geq 1/10000$  до  $< 1/1000$ ), очень редко ( $< 1/10000$ ), не известно (частота не может быть оценена на основании имеющихся данных).

Частота не известна: аллергические реакции (крапивница, кожная сыпь, одышка, отек Квинке).

Частота не известна: желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея) у пациентов с повышенной чувствительностью.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

### **Передозировка.**

При применении лекарственного средства в дозе, превышающей суточную дозу в 3 раза, могут появиться тошнота, рвота, диарея и возбуждение, что требует немедленного обращения к врачу. Лечение: симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Специальных исследований не проводилось. Сведений о взаимодействии с другими лекарственными средствами нет.



Не рекомендовано одновременное применение с противокашлевыми лекарственными средствами, такими как, кодеин или дексстрометорфан.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

#### **Особые указания.**

Необходимо с осторожностью назначать лекарственное средство пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или в случае ухудшения состояния (возникновение одышки, повышение температуры, появление мокроты с примесью гноя или крови), следует незамедлительно проконсультироваться с врачом.

#### *Указание для пациентов с сахарным диабетом.*

2,5 мл сиропа содержат 0,963 г сахарозаменяющего вещества сорбитола = 0,08 хлебные единицы.

Сорбитол может оказывать слабое слабительное действие.

В связи с содержанием сорбита лекарственное средство не следует принимать пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы.

В процессе хранения возможно легкое помутнение сиропа и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата.

#### **Форма выпуска.**

Сироп; по 100 мл во флаконы темного стекла с полиэтиленовой пробкой-дозатором, навинчиваемой крышкой и мерным колпачком. Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

#### **Условия хранения.**

При температуре не выше +25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте!

#### **Срок годности.**

3 года.

Срок годности после вскрытия флакона – 6 месяцев.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

#### **Условия отпуска из аптек.**

Без рецепта.

#### **Производитель.**

Энгельгард Арцнаймиттель ГмБХ и Ко. КГ,  
Херцбергштрассе, 3, Д-61138 Нидердорфельден, Германия.

