

**ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
лекарственного средства
(информация для специалистов)**

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь №
от 19.10.05 № 1090

л.л. № 9-01.10.15

**СОЛИДАГОРЕН
(SOLIDAGOREN®)**

Основные физико-химические свойства

Прозрачная жидкость коричневого цвета.

Состав лекарственного средства

действующее вещество: 1 мл (= 0,95 г) капель для внутреннего применения содержит 0,79 мл Солекван-экстракта (жидкого экстракта (1:1,5 - 2,1) из смеси трав золотарника обыкновенного (Solidaginis herba), лапчатки гусиной (Anserinae herba), хвоща полевого (Equiseti Herba) (4,2 : 1,4 : 1), экстрагент: этанол 50 % (об/об);
вспомогательные вещества: этанол 96 % (об/об), вода очищенная.

Лекарственная форма

Капли для внутреннего применения.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие урологические средства. Код ATC G04BX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика:

Традиционное растительное лекарственное средство.

Отдельные фармакодинамические исследования на препарат не проводились.

Фармакокинетика:

Отдельные фармакокинетические исследования на препарат Солидагорен не проводились.

Показания к применению

Традиционное растительное лекарственное средство для лечения воспалительных заболеваний мочевыводящих путей (в составе комплексной терапии).

Дети

Препарат не предназначен для применения у детей в возрасте до 12 лет.

Режим дозирования и способ применения

Взрослым и детям старше 12 лет:

20 - 30 капель Солидагорена 3 раза в день. 30 капель соответствует 1,4 мл.

Солидагорен следует принимать с достаточным количеством жидкости.

Длительность применения определяется врачом индивидуально.

Побочные действия

Очень редко: реакции гиперчувствительности и аллергические реакции.

Частота неизвестна: легкие расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.

В случае появления первых признаков аллергической реакции (например, сыпь) прием препарата следует прекратить. В случае появления побочных эффектов не указанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активному веществу или любому другому компоненту препарата. Не следует применять препарат Солидагорен в случае аллергии на растения семейства Астровые (Asteraceae), поскольку растения указанного семейства используются при производстве растительного экстракта, который входит в состав препарата.

Тяжелые формы сердечной и почечной недостаточности, в том числе заболевания, при которых необходимо ограничивать употребление жидкости.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось. В случае передозировки - лечение симптоматическое.

Меры предосторожности

Не следует применять препарат для диуретической терапии отеков, вызванных сердечной недостаточностью или почечной недостаточностью. Это особенно важно учитывать при применении у людей пожилого возраста.

При наличии крови в моче, высокой температуры тела или при сохранении симптоматики более 5 дней, рекомендовано обратиться к врачу.

Препарат содержит 45% об/об спирта. При соблюдении рекомендуемой дозы в организм попадают 0,6 г алкоголя с каждым приемом 30 капель. В связи с этим возможен риск для здоровья пациентов с заболеваниями печени, алкогольной зависимостью, эпилепсией, органическими поражениями мозга; беременных и кормящих женщин, детей. Препарат может уменьшать или усиливать действие других лекарственных средств.

Одновременное применение препарата с синтетическими мочегонными средствами не рекомендуется.

Применение при беременности и лактации

Применение препарата Солидагорен в период беременности или кормления грудью не рекомендуется.

Влияние на способность вождения автотранспорта и работы со специальным оборудованием

Не влияет при соблюдении рекомендованных доз.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

В связи с наличием алкоголя в препарате, он может влиять на действие других препаратов.

Условия хранения и срок годности

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в защищённом от света и недоступном для детей месте.

Срок годности данного препарата составляет 3 года.

Срок годности после вскрытия флакона - 3 месяца.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Форма выпуска и упаковка

Капли для внутреннего применения.

По 20 мл, 50 мл или 100 мл капель во флаконе из коричневого стекла с капельницей и с пластмассовой завинчивающейся крышкой.

По 1 флакону вместе с листком-вкладышем упаковывают в картонную коробку.

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия /

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany